

# Erlaubte Substanzen und Substanzen mit empfohlenen Karenzzeiten

## Sicher und sauber durch die Turniersaison

Die Art und Weise, wie Nachweiszeiten ermittelt werden, bedeutet, dass sie nicht auf jedes Pferd übertragbar sind. Darüber hinaus sind Faktoren wie die Wirkung der Substanz, ihre Dosierung, die Häufigkeit der Gabe sowie insbesondere die Erkrankung des Pferdes zu berücksichtigen. Daher ergibt sich die Notwendigkeit, die Nachweiszeit mit einem zeitlichen Sicherheitszuschlag zu versehen. Diese Zeit, von der Gabe der Substanz bis zum Einsatz auf dem Turnier, nennt man Karenzzeit. Karenzzeiten lassen sich einerseits von Nachweiszeiten statistisch abgesichert ableiten oder sie beruhen auf pharmakologischen und veterinärmedizinischen Erkenntnissen. Die Karenzzeit darf nicht mit der Wartezeit eines Medikamentes verwechselt werden. Die Wartezeit beschränkt arzneimittelrechtlich die Anwendung einer Substanz bei Pferden, die der Lebensmittelgewinnung dienen.

Die von der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) veröffentlichten Karenzzeiten sind als Empfehlung zu verstehen. Sie beinhalten großzügig angesetzte Sicherheitsaufschläge. Sie sind im Einzelfall jedoch keine absolute Garantie dafür, dass bei Berücksichtigung der Karenzzeiten ein positives Ergebnis bei einer Medikationskontrolle verhindert wird.

***Merke: In der Biologie und der Medizin gibt es keine 100-prozentige Sicherheit. Daher beinhaltet auch die empfohlene Karenzzeit ein Restrisiko.***

| Substanz                        | empfohlene Karenzzeit |
|---------------------------------|-----------------------|
| Acepromazin, oral               | 9 Tage                |
| Acetylcystein                   | 8 Tage                |
| Arnika                          | 2 Tage                |
| Ätherische Öle zur Inhalation   | 2 Tage                |
| Ätherische Öle im Futtermittel  | 2 Tage                |
| Beclomethason                   | 7 Tage                |
| Budesonid                       | 7 Tage                |
| Butylscopolamin                 | 4 Tage                |
| Carprofen                       | 30 Tage               |
| Clenbuterol                     | 21 Tage               |
| Dembrexin                       | 9 Tage                |
| Detomidin                       | 6 Tage                |
| Dexamethason, wässrig i.v.      | 14 Tage               |
| Dexamethason, Depot, Langzeit   | min. 60 Tage          |
| Elektrolytlösungen per Infusion | 2 Tage                |
| Eltenac                         | 24 Tage               |
| Eukalyptus                      | 2 Tage                |

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Firocoxib                            | 30 Tage |
| Flunixin, i.v. und oral              | 18 Tage |
| Fluticason                           | 7 Tage  |
| Furosemid                            | 6 Tage  |
| Gentamicin                           | 8 Tage  |
| Glaubersalz                          | 2 Tage  |
| Heparin äußerlich                    | 2 Tage  |
| Homöopathika bis einschließlich D6   | 2 Tage  |
| Hyaluronsäure parenteral             | 2 Tage  |
| Ingwer                               | 2 Tage  |
| Ipratropium-Bromid                   | 10 Tage |
| Ketoprofen                           | 12 Tage |
| Lidocain                             | 6 Tage  |
| Meloxicam                            | 9 Tage  |
| Mepivacain                           | 6 Tage  |
| Metamizol                            | 9 Tage  |
| Methylprednisolonacetat              | 60 Tage |
| Naproxen                             | 30 Tage |
| Oxytetryklin                         | 8 Tage  |
| Phenylbutazon                        | 14 Tage |
| Phoxim, äußerlich                    | 8 Tage  |
| Pilzimpfung                          | 7 Tage  |
| Prednisolon, oral                    | 6 Tage  |
| Procain-Penicillin                   | 56 Tage |
| Ranitidin                            | 8 Tage  |
| Reiskeimöl                           | 2 Tage  |
| Romifidin                            | 7 Tage  |
| Salbutamol, per Inhalation           | 8 Tage  |
| Spitzwegerich*                       | 2 Tage  |
| Süßholz*                             | 2 Tage  |
| Suxibuzon                            | 14 Tage |
| Teufelskralle                        | 4 Tage  |
| Thymian*                             | 2 Tage  |
| Triamcinolon-Acetonid, in das Gelenk | 56 Tage |
| Trimethoprim + Sulfonamide           | 8 Tage  |
| Vedaprofen                           | 12 Tage |
| Weihrauch*                           | 2 Tage  |

**\*in verkaufsfertigen Futtermitteln ADMR-konform, sofern der Anteil 0,5 Prozent nicht übersteigt.**

Die Karenzzeit gibt Auskunft über die empfohlene Zeitspanne, von der Gabe einer Substanz bzw. der Anwendung einer Methode bis zum Einsatz auf dem Turnier. Stand Januar 2013.

**Auflistung der erlaubten Substanzen:**

ADMR-konform bedeutet, dass die Substanz im Wettkamp erlaubt ist.

| <b>erlaubte Substanzen</b>    |              |
|-------------------------------|--------------|
| Akridinpulver *               | ADMR-konform |
| Ätherische Öle, äußerlich     | ADMR-konform |
| Altrenogest bei Stuten        | ADMR-konform |
| Chondroitinsulfat, oral       | ADMR-konform |
| Dexpanthenol-Salbe            | ADMR-konform |
| Effektive Mikroorganismen     | ADMR-konform |
| Elektrolyte, oral             | ADMR-konform |
| Essigsäure Tonerde            | ADMR-konform |
| Glukosaminoglykane, oral      | ADMR-konform |
| Homöopathika ab D7            | ADMR-konform |
| Honigsalbe                    | ADMR-konform |
| Hyaluronsäure, oral           | ADMR-konform |
| Jodoformpulver                | ADMR-konform |
| Jodlösung,-salbe, -spray      | ADMR-konform |
| Kochsalzlösung, physiologisch | ADMR-konform |
| Lorbeeröl, äußerlich, Huf     | ADMR-konform |
| Melkfett                      | ADMR-konform |
| Nelkenöl                      | ADMR-konform |
| Omeprazol                     | ADMR-konform |
| Paraffinöl                    | ADMR-konform |
| Paramunitätsinducer           | ADMR-konform |
| Pilzmittel, äußerlich         | ADMR-konform |
| Ringelblumensalbe             | ADMR-konform |
| Rosmarinöl, äußerlich, Huf    | ADMR-konform |
| Zink-Lebertransalbe           | ADMR-konform |
| Zinksalbe, -spray             | ADMR-konform |

\*Akridinpulver ist nur bei Pferden anwendbar, die nicht der Lebensmittelgewinnung dienen und sofern eine Umwidmung vertretbar ist.